SCHEDA DI VALUTAZIONE MEDICINA GENERALE INFEZIONI VIE RESPIRATORIE SUGGESTIVE RISCHIO COVID-19

NEI CASI SOSPETTI INVIARE LA SCHEDA VIA MAIL(*) A coronavirus@asp.messina.it PER L'ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE SUCCESSIVE

MEDICO	Luogo	DATA /	/ OF	RA
	DATI PAZIENTE			
Cognome	Nome			
Data Nascita	Luogo Di Nascita			
Residenza Via			N.	
Comune	Prov.	Tel./Cell.		
Numero dei conviventi				
VALUTAZIONE EPIDEMIOLOGICA DI PAZIENTE SINTOMATICO PER AFFEZIONI VIE RESPIRATORIE				
SOGGIORNO IN PAESE/LOCALITÀ A	A RISCHIO:			
□ SI □ NO □	NON NOTO			
SE SI SPECIFICARE				
PAESE				
DATA DI PARTENZA DALLA ZONA A I	RISCHIO//			
ESPOSIZIONE A CASI ACCERTATI (vi	ivi o deceduti) 🔲 SI	□ NO		
ESPOSIZIONE A CASI SOSPETTI O A	D ALTO RISCHIO (CASI PROBABILI	I) 🗆 SI 🗖	NO	
CONTATTI CON PERSONE RIENTRA	TE DA PAESE/LOCALITA' A RISCHI	0 🗖 SI 🔲	NO	
CONTATTI CON FAMILIARI DI CASI S	OSPETTI 🗖 SI 🔲 N	10		

VALUTAZIONE CLINICA TELEFONICA PAZIENTE FEBBRILE

DATA DI COMPARSA DEI SINTOMI:/				
Temperatura corporea superiore a 38°C: SI°C NO				
Nel caso di presenza di anche 1 solo elemento tra i seguenti, si allerta direttamente 112				
Coscienza alterata				
Pressione sistolica bassa se valutabile dal paziente (minore o uguale 100)				
Ha difficoltà a respirare a riposo				
Nel caso non sussistano le condizioni precedenti, si procede come segue:				
Valutazione delle condizioni di rischio note al medico o confermate telefonicamente				
 Malattie Polmonari Malattie cardiache Malattie renali Malattie sistema immunitario Malattie oncologiche Malattie metaboliche Gravidanza Isolamento sociale (vive solo, e/o senza fissa dimora) Non autosufficiente 				
Valutazione Stato vaccinale noto al medico o confermato telefonicamente ■ Vaccinato antinfluenzale ■ Vaccinazione antipneumococco ■ Nessuna delle precedenti vaccinazioni				
Valutazione clinica				
□Il respiro è lento (- sotto16 atti al minuto-)				
□Il respiro è accelerato (- sopra 20 atti al minuto)				
\Box Ha difficoltà a respirare dopo un lieve sforzo (alzarsi dalla sedia/letto), si affatica a camminare o no piedi	on sta in			
□ Il paziente è tachicardico (indicare al paziente/convivente come misurare la frequenza cardiaca, ve se disponibilità di App cellulare, cardiofrequenzimetro da polso utili allo scopo, ottenere il dato)	rificare			
□ Il paziente ha segni di cianosi periferica (suggerire controllare colore letto ungueale e tempo di refi digitopressione, colore cute e labbra)	ll dopo			
□ Valutare la capacità del paziente di parlare al telefono e il coordinamento con la respirazione				

Se il processo diagnostico (condizioni di rischio, dato vaccinale e quadro clinico) è suggestivo di sospetto impegno polmonare (polmonite) si richiede attivazione del 112 o servizio attrezzato per valutazione domiciliare secondo direttive regionali.

In caso contrario valutare tempi e modalità per rivalutazione telefonica del caso, con informazioni chiare e concordate con il paziente, forti del patto fiduciario, disincentivare iniziative di ricorso autonomo ai servizi sanitari (Pronto Soccorso, Ambulatorio Medico di Famiglia, Continuità Assistenziale) in assenza di contatto con i numeri di pubblica utilità su Coronavirus (1500 Ministero, numeri verdi regionali) o con il proprio medico curante.

Nel caso in cui il paziente:	
□ Respira normalmente	
□ È in grado di rimanere in piedi	
□ È in grado di svolgere le normali attività (vestirsi, lavarsi, lavori in casa)	
Ma sintomatico	
□ Tosse □ Mal di gola □ Dolori muscolari □ Malessere generale □ Anoressia □ Vomito □	Cefalea
Suggerire isolamento e riduzione dei contatti, uso di mascherine (**), guanti (**) a protezione dei co lavaggio frequente delle mani, areazione frequente degli ambienti, valutare tempi e modalità per rival telefonica del caso, con informazioni chiare e concordate con il paziente, forti del patto fiduciario, disincipiziative di ricorso autonomo ai servizi sanitari (Pronto Soccorso, Ambulatorio Medico di Famiglia, Canassistenziale) in assenza di contatto con i numeri di pubblica utilità su Coronavirus (1500 Ministero verdi regionali) o con il proprio medico curante.	utazione entivare ontinuità
(**) Ottenere informazioni dalla Azienda Sanitaria o dalle Farmacie, competenti per territorio, sulla promitura/distribuzione dei dispositivi indicati, per comunicarla al paziente.	oossibile